

# COMPUESTO ORGANICO DE YODURO



Polvo oral. Desinfectante, expectorante y fuente de yodo.  
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0040-044  
USO VETERINARIO

**FORMULA:** Cada 100 g contienen:

Dihidroyoduro de Etilendiamina — 4.57 g  
Excipiente c.b.p. — 100 g



**ACCION:** Es un agente antibacteriano de acción sistemática que bien dosificado es tolerado perfectamente para la prevención y tratamiento de actinomicosis y necrobacilosis. Tiene una acción expectorante y es además una fuente de yodo.

**INDICACIONES:** Para uso dietético como fuente de yodo en la prevención y tratamiento de las deficiencias de yodo; como expectorante en infecciones respiratorias leves del ganado; en la prevención y tratamiento de necrosis en las patas en el ganado cuando es causado por el *Spherophorus necrophorus*; en las infecciones de la lengua y quijada, cuando es causado por *Actinomyces lignieresii*.

**VIA DE ADMINISTRACION:** Oral.

**DOSIFICACION:** Preventivo en necrosis de las patas y actinimicosis en bovinos, mezcle 500 g de compuesto orgánico de yoduro en 16 K de sal o mezcle 28 g en el alimento diario por cada 25 cabezas.

Para tratamiento agregue a la ración 285 g por cada 25 cabezas durante 2 a 3 semanas Individual administre dos cucharaditas por cabeza diariamente en el alimento, durante 2 a 3 semanas.

Como fuente de yodo: Mezcle 250 g de compuesto orgánico de yoduro en 50 K de sal y ofrézcala continuamente. O mezcle 28 g en la ración diaria por cada 625 cabezas, o una cucharadita por cada 100 cabezas.

Como expectorante en ganado bovino y equino: mezcle 28 g por animal dos veces al día, en el alimento o agua, no se administre por más de siete días.

**ADVERTENCIA:** Después de iniciado el tratamiento, observar la tolerancia. La medicación deberá ser limitada a 10-14 días y si hay síntomas de intoxicación (lagrimeo, caída de pelo, debilidad general, escurrimiento nasal), suprima el tratamiento.

**PRESENTACION:** Botes de 500 g y cuñetes de 10 Kg.

COMPUESTO ORGANICO DE YODURO